





PIANO TRATTAMENTO INDIVIDUALE DELLO STUDENTE/STUDENTESSA **CON EPILESSIA**

(a cura dello specialista)

SI PRESCRIVE LA SOMMINISTRAZIONE IN ORARIO SCOLASTICO, DA PARTE DI

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Vista la richiesta dei genitori e constatata l'assoluta necessità

SANITARIO, DEI FARMACI SOTTOINDICATI PERSONALE NON ALLO STUDENTE/STUDENTESSA Cognome: ______ Nome : _____ Data di nascita Diagnosi per cui può essere richiesto un intervento di emergenza Scuola ITT BUONARROTI - TRENTO Classe Padre: Nome: ______ Cognome: ______... Indirizzo ______ Tel. casa: ______. Tel. Lavoro: ______ Tel. Cellulare: ... **Madre:** Nome: ______ Cognome: ______... Indirizzo ______ Tel. casa: ______. Tel. Lavoro: ______ Tel. Cellulare: ______... Altri numeri da contattare in caso di emergenza: (1) Nome: _____. Cognome: _____ Relazione con lo studente/studentessa: _____.Tel.: ____ cellulare: ____

(2) Nome: _____ Cognome: ____









Relazione con lo studente/studentessa	:Tel.: _	cellulare:	
Medico curante:			
Nome:	Cognome:		
Indirizzo:	Tel.: cel	llulare:	
□ Farmaci per la continuità terapeut	i <u>ca</u>		
Farmaco	Nome commerciale	Principio attivo	
	<u> </u>		
Dose			
Quante volte			
Come			
Presidi da utilizzare			
Modalità conservazione			
Note			
Data			

Timbro e firma del Medico

SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN CASO DI CRISI EPILETTICA PROLUNGATA/CRISI FEBBRILE PROLUNGATA

(a cura dello Specialista)

Somministrazione di Diazepam		
Si certifica che lo studente/ssa	, nato/a il	_ ha diagnosi di
In caso di crisi convulsiva si consiglia di porre il/la studente/ss fianco e, nel caso in cui la crisi si prolunghi oltre i minu somministrazione di Micropam (microclisma) (specifi	uti, si dà indicazione alla	l
Il farmaco si può conservare in frigorifero o a temperatura amb	oiente, purché lontano d	a fonti di calore.
Si dichiara, inoltre, che si tratta di un farmaco che può essere so adeguatamente formato, di cui si autorizza fin d'ora l'intervento.	_	ale non sanitario
Si rilascia per gli usi consentiti		
Data		
dott		

SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN CASO DI CRISI EPILETTICA PROLUNGATA/CRISI FEBBRILE PROLUNGATA

(a cura dello Specialista)

Somministrazione di Midazolam
Si certifica che lo studente/ssa
nato/a ilha diagnosi
di
In caso di crisi convulsiva si consiglia di porre il paziente in posizione di sicurezza su di un fianco e, nel caso in cui la crisi si prolunghi oltre i cinque minuti, si dà indicazione alla somministrazione di Buccolam©
(specificare la dose) oro-mucosale
L'intera quantità deve essere inserita lentamente nello spazio tra la gengiva e la guancia metà dose da un lato e metà dall'altro.
Se la crisi non cessa entro 1 minuto dalla somministrazione di midazolam, deve essere richiesta assistenza medica d'emergenza e la siringa vuota deve essere consegnata all'operatore sanitario, per fornire informazioni sulla dose ricevuta dal paziente.
Quando le crisi si ripresentano dopo una risposta iniziale, una seconda dose o una dose ripetuta non deve essere somministrata senza consultare prima il medico.
Il farmaco si può conservare a temperatura ambiente, purché lontano da fonti di calore.
Si dichiara, inoltre, che si tratta di un farmaco che può essere somministrato da personale non sanitario adeguatamente formato, di cui si autorizza fin d'ora l'intervento. La somministrazione del farmaco è ripetibile a breve distanza da precedente somministrazione in caso della persistenza di crisi convulsiva SOLO da personale medico specializzato.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Data